

Poule et coq Dorking saumoné



Dès l'arrivée des œufs, les déballer et procéder à un mirage pour déceler des éventuelles fêlures dû au voyage. Les installer à l'horizontale ou la tête en bas pour un repos de 24h avant mise en couveuse.

Réglez votre couveuse à une température allant de 37.5°C à 37.7°C selon le modèle, et remplissez un bac pour obtenir une hygrométrie de 40% à 45%. Je vous conseille de démarrer votre couveuse deux heures avant la mise en incubation des œufs, pour que les valeurs se stabilisent.

Après les 24h de repos, c'est l'heure de la mise en incubateur, selon le modèle de votre couveuse vous devrez disposer les œufs à l'horizontale ou la tête en bas. Le retournement des œufs doit être fait au moins 2 fois par jour à partir du 3^{ème} jour.

Le mirage des œufs en période d'incubation n'est pas obligatoire, vous pouvez toutefois mirer les œufs le 7^{ème} jour pour éliminer les œufs clairs. (en fonction de la couleur de l'œuf c'est plus ou moins faisable...) Il est conseillé d'effectuer un mirage jour 19 pour vérifier le bon développement des embryons avant l'éclosion.

C'est parti pour 19 jours d'incubation ! Après ces 19 jours, il faut arrêter de retourner les œufs et monter l'hygrométrie jusqu'à 65%-70%.

A partir du jour 20 les poussins s'activent dans l'œuf ! Surtout il faut éviter d'ouvrir la couveuse inutilement pour ne pas perdre d'humidité ou de degrés. Les éclosions peuvent avoir lieu jusqu'au 23^{ème} jour, donc patience !

Nous vous souhaitons une bonne réussite et de beaux poussins !!!